



CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT A  
L'ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA.



MALALTIA	SÍMPTOMES	RECOMANA ASSISTIR A L'ESCOLA
<b>FARINGITIS, PNEUMÒNIA</b>	Febre i simptomatologia segons la malaltia	<b>Fins 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic</b>
<b>CONJUNTIVITIS BACTERIANA (PURULENTA)</b>	Llagrimeig, congestió d'ulls, fotofòbia, inflamació de les parpelles	<b>Fins 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic</b>
<b>ERITEMA INFECCIÓS (Virus de la bufetada)</b>	Exantema a galtes; a les 24h s'estén a braços, extremitats inferiors, natges i tronc	<b>Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé</b>
<b>ESCARLATINA</b>	Febre, angines inflamades, erupció a la pell	<b>Fins 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic</b>
<b>ESTOMATITIS AFTOSA (Llagues a la boca)</b>	Febre, vesícules i úlceres a la boca i llavis, dificultat per menjar	<b>Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé</b>
<b>EXANTEMA SOBTAT</b>	Febre alta amb durada de 3 dies, símptomes respiratoris. Cedeix la febre i apareix l'exantema a coll i tronc (1-3 dies)	<b>Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé</b>
<b>DERMATITIS DEL BOLQUER</b>	Irritació perineal	<b>Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé</b>
<b>FONGS ALS PEUS</b>	Picors a la nit, descamació i fissures al peu	<b>Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé</b>
<b>GASTROENTERITIS VIRAL</b>	Dolor abdominal, diarrea, vòmits.	<b>Fins 48h després de la última diarrea o vòmit.</b>
<b>GRIP</b>	Mal de cap, febre, malestar general, mal de coll i tos	<b>Quan estigui sense febre i amb bon estat general</b>
<b>HEPATITIS A</b>	Malestar, febre, nàusees, cansament i aspecte groguenc a la pell	<b>Fins a 7 dies després que l'infant es posa groc</b>
<b>HEPATITIS B</b>	Igual que Hepatitis A	<b>Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé</b>
<b>MUGUET (Fongs a la boca)</b>	Lesions blanquinoses a la mucosa oral i llengua	<b>Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé</b>
<b>PAROTIDITIS (Galteres)</b>	Dolor muscular, febre, mal de cap, tumefacció a les glàndules paròtides	<b>Fins a 5 dies després d'iniciada la inflamació de la paròtide</b>
<b>POLLS</b>	Picor i visualització directa de llémenes (ous) o del paràsit	<b>Fins a iniciar el tractament. La presència de llémenes no és motiu d'exclusió</b>
<b>REFREDAT COMÚ</b>	Llagrimeig, esternuts i malestar general	<b>Pot acudir a l'escola si està sense febre i sense dificultat respiratòria</b>
<b>SALMONEL·LA i CAMPYLOBACTER</b>	Diarrea amb sang, dolor abdominal, febre	<b>Fins a indicació del metge o infermera</b>
<b>SARNA</b>	Picors, principalment a la nit, amb vesícules a la zona dels plecs	<b>Fins a realitzar el tractament</b>
<b>VARICEL·LA</b>	Febre, erupció vesiculosa amb picor a cara, cos i extremitats	<b>Fins a 7 dies després d'iniciada l'erupció o fins que totes les lesions estiguin en forma de crosta</b>

<b>XARAMPIÓ</b>	Febre alta, tos, erupció a tronc, cara, coll i extremitats; conjuntivitis	<b>Fins a 5 dies després del començament de l'exantema</b>
<b>MONONUCLEOSI INFECCIOSA</b>	Faringitis, febre, ganglis, augment del fetge i melsa	<b>Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé</b>
<b>IMPETIGEN</b>	Lesions cutànies amb crostes de color groguenc	<b>Fins a 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic</b>
<b>MALALTIA BOCA-MÀ-PEU</b>	Febre de 2-3 dies i aparició de l'erupció característica (petites vesícules a boca, mans i peus)	<b>Pot acudir a l'escola sempre i quan no tingui febre ni salivera.</b>

#### CAL TENIR EN COMPTE:

- En totes les malalties que cursen amb febre, a més de les recomanacions específiques per a cadascuna d'elles, cal que l'infant hagi estat 24h sense febre abans de tornar a l'escola. L'infant no ha d'assistir al centre si la malaltia impedeix que dugui a terme les seves activitats amb normalitat o requereix més atencions de les que els responsables a càrrec poden donar-li .
- Amb febre superior a 37,5 ° l'infant no pot assistir al centre. En el cas que presenti febre en horari escolar es trucarà a la família per tal que el vinguin a recollir i haurà d'estar 24h sense febre abans de tornar a l'escola.
- El centre no administrarà cap medicament sense recepta mèdica i document d'autorització de subministrament de medicament (penjat al web).
- L'infant no ha d'assistir al centre si presenta símptomes clars que afecten el seu comportament: febre, letargia, irritabilitat, plora constantment, respira amb dificultat o altres signes que evidencin una malaltia greu. No és correcte amagar aquests símptomes amb medicació ja que es pot transmetre la malaltia a la resta del grup i hi pot haver algun infant vulnerable.

